

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta, das 7h às 12h | 13h às 17h

R. Itatiaia, 96 . Farol . Maceió-AL
82 3311 1500 | hemopac@hemopac.com.br
www.hemopac.com.br



LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESCRITAS E EM CASO DE DÚVIDAS ESTAMOS A SUA DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

Tipos de doação:

•Sangue Total: Consiste na retirada de aproximadamente 450 ml de sangue, esse processo dura em média 10 minutos.

•Plaquetas por Aférese: Consiste na separação das plaquetas dos demais componentes do sangue (plasma e hemácias), esse processo dura em media setenta minutos.

TODO MATERIAL É DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

Atenção:

A cada doação são realizados exames e em caso de dúvidas ou alterações do resultado, o doador é convocado para orientação e/ou repetição dos testes.

Esses exames têm o objetivo de triagem e não de diagnóstico, podendo ocorrer resultados falso-positivos.

Portanto, a princípio não há necessidade de preocupação caso você seja convocado para repetir os testes.

Risco de doação:

Em geral a doação de sangue não traz riscos para o doador, ocasionalmente alguns doadores podem apresentar os seguintes sintomas:

- Tontura ou náuseas;
- Mancha Roxa no local da punção.

Em caso de doação por aférese pode ocorrer o formigamento nos lábios que é controlado.

Informações Importantes:

- Não se deve estar em jejum;
- Deve-se dormir no mínimo seis horas;
- Deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas doze horas

Intervalo de doação:

Sangue Total: 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Plaquetas por Aférese: 48 horas para ambos os sexos.

A QUANTIDADE DOADA É REPOSTA RAPIDAMENTE.

RESTRIÇÕES NA DOAÇÃO DE SANGUE

Não devem doar sangue:

- Pessoas com peso inferior a 50 kg;
- Pessoas com idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos (*1ª doação para pessoas com menos de 60 anos*);
- Pessoas que contraíram gripe a menos de uma semana;
- Pessoas que contraíram hepatite após os 10 anos de idade;
- Pessoas portadoras da doença de Chagas ou que estiveram em contato com o inseto "barbeiro";
- Pessoas que contraíram sífilis ou gonorréia;
- Pessoas com doença infecciosa prévia ou em atividade;
- Pessoas que há menos de um ano fizeram: tatuagens, piercing ou acupuntura com material não descartável;
- Pessoas com diabetes e/ou doenças crônicas;
- Mulheres em período de gestação ou até 12 meses após o parto ou abortamento;
- Pessoas com maiores riscos de exposição ao vírus da AIDS, tais como:
 - Usuários ou ex-usuários de drogas endovenosas;
 - Pessoas com parceiros sexuais infectados pelo vírus HIV;
- Pessoas com histórico recentes de DSTs;
- Homens ou mulheres com múltiplos(as) parceiros(as) que tenham relações sexuais sem o uso do preservativo.

Atenção:

Caso seja doador de plaquetas você não deve ter ingerido há pelo menos três dias os medicamentos como: Analgésicos, antiinflamatórios e antiagregante plaquetário.

Exemplos: Voltaren, Cataflan, Aspirina (AAS - ácido acetilsalicílico), clopidogrel, ticlopidina e cilostazol abcximab.

OUTRAS CONDIÇÕES PODEM IMPEDIR A DOAÇÃO E SERÃO ANALISADAS DURANTE A ENTREVISTA DE TRIAGEM CLÍNICA.

Lembre-se que:

No caso de você omitir ou negar informações importantes sobre sua saúde ao entrevistador você poderá prejudicar a si mesmo ou a quem recebe seu sangue.
É obrigatório o doador trazer um documento com foto que o identifique.